

معاون محترم بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... دانشگاه/

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: دستورالعمل چگونگی تهیه سوسپانسیون از کپسول اوسلتامیویر - مهر ۱۴۰۱

با سلام و احترام

پیرو نامه ۳۰۴/۱۴۳۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مبنی بر ارسال دستورالعمل چگونگی تهیه سوسپانسیون از کپسول اوسلتامیویر و با عنایت به سوالات مکرر همکاران در زمینه نحوه تهیه سوسپانسیون فوق در برنامه مراقبت آنفلوانزا که دستورالعمل آن طی سالهای قبل ارسال و در جلسات آموزشی و کارگاههای کشوری آموزش آن ارائه گردیده است، مجدداً به استحضار می‌رساند:

۱- بطور معمول داروی اوسلتامیویر جهت درمان بیماران مبتلا به آنفلوانزا به مدت ۵ روز و جهت پیشگیری بمدت حداقل ۷ روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- داروی اوسلتامیویر به حرارت حساس بوده و باید در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

۳- جهت کودکان از سوسپانسیون اوسلتامیویر استفاده می‌شود و در صورتی که سوسپانسیون در دسترس نباشد می‌توان به روش زیر از کپسول اوسلتامیویر آن را تهیه نمود:

- محتوی کپسول ۷۵ میلی گرمی اوسلتامیویر را در مقداری آب (۲۸-۷۵ سی سی) حل نموده و از آن استفاده شود. این محلول قابل نگهداری در یخچال بمدت ۲۴ ساعت می‌باشد. اگر در ۲۸ سی سی آب محلول تهیه شود هر سی سی آن معادل ۲ میلی گرم و اگر در ۷۵ سی سی آب حل شود هر سی سی معادل یک میلی گرم می‌باشد. ترجیحاً با عنایت به تلخ بودن محلول تهیه شده و امتناع کودکان از خوردن آن و همچنین حل شدن بهتر دارو در محلول قندی، توصیه می‌شود بجای آب از محلول دکستروز ۱۰ درصد به میزان توصیه شده استفاده شود.
- در جدول زیر میزان دوز توصیه شده داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر جهت درمان و پیشگیری ارائه می‌گردد.

خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه پزشکان محترم رسانیده شود.

| گروه سنی | درمان | پیشگیری |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| اوسلتامی ریز | | |
| بزرگسالان | ۷۵ میلی گرم (یک کپسول) دوبار در روز | ۷۵ میلی گرم یکبار در روز |
| کودکان بالای یکسال | ۱۵ کیلوگرم یا کمتر | ۶۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی |
| | ۱۵ تا ۲۳ کیلوگرم | ۹۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی |
| | ۲۳ تا ۴۰ کیلوگرم | ۱۲۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی |
| | بیشتر از ۴۰ کیلوگرم | ۱۵۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی |
| زیر ۳ ماه | ۱۲ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی | پیشنهاد نمی شود |
| ۳ ماه تا ۵ ماه | ۲۰ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی | ۲۰ میلی گرم روزانه |
| ۶ ماه تا ۱۱ ماه | ۲۵ میلی گرم روزانه در ۲ دوز مساوی | ۲۵ میلی گرم روزانه |

دکتر شهنام عرشى
 سرپرست مرکز مدیریت
 بیمارهای واگیر

