

معیار ارزیابی ریسک سقوط (هامپی دامپی) در کودکان

عنوان	معیار	نمره
سن	کمتر از ۳ سال	۴
	بین ۳ تا ۷ سال	۳
	بین ۷ تا ۱۳ سال	۲
	۱۳ سال و بزرگتر	۱
جنسیت	دختر	۱
	پسر	۲
تشخیص های بالینی	تشخیص نورولوژیک	۴
	اختلال در اکسیژنرسانی (آنمی، بیماری تنفسی، دهیدراتاسیون، سنکوپ و..)	۳
	اختلالات روانی_ رفتاری	۲
	تشخیص های دیگر	۱
اختلالات شناختی	عدم آگاهی از محدودیت ها	۳
	فراموش کردن محدودیت ها	۲
	آگاه و آشنا به توانائی های خود	۱
فاکتورهای محیطی	سابقه سقوط نوزاد یا کودک از تخت	۴
	بیمار از وسایل کمک حرکتی استفاده می کند، یا نوزاد و شیرخوار در تخت است	۳
	بیمار در تخت است	۲
	ناحیه خارج از تخت بیمار	۱
پاسخ به جراحی / مسکن	طی ۲۴ ساعت گذشته	۳
	طی ۴۸ ساعت گذشته	۲

۱	بیش از 48 ساعت گذشته است یا اصلاً انجام نشده است	یا بیهوشی
۳	<p>استفاده همزمان از داروهای زیر:</p> <p>مسکن ها (به غیر از بیماران بستری در ICU و بیماران فلج)</p> <p>هایپنوتیک ها</p> <p>-باربیتورات ها</p> <p>-فنوتیازین ها</p> <p>-ضدافسردگی ها</p> <p>-ملین ها / دیورتیک ها</p> <p>-تارکوتیک ها</p>	داروهای مصرفی
۲	یکی از داروهای لیست بالا	
۱	داروهای دیگر / عدم مصرف دارو	

اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان